

レジメン名称：P18-302 Pembrolizumab/CBDCA/nabPTX(d1,8,15) q3w 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
		ペリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ペミロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●		
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	1瓶			
		点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キトルダ）				
注射	3	点滴注射		●		
		キトルダ注 （200mg/body）	200m g			
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100m L			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で				
注射	4	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg／1m l	6.6m g			
		アロカリス注 235mg／10m L	1瓶			
		アロキシ注バッグ 0.75mg／50m L	1袋			
		点滴注射：1日1回 30分で キトルダと別（フィルターなし）ルートで。				
注射	5	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回 アロキシ投与前後フラッシュ用				
注射	6	点滴注射		●		
		アブラキサン注 （100mg/m ² ）	100m g/m ²			
		生理食塩液 P L 50m l （1バールあたり20mLで溶解）	50m L			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で				
注射	7	点滴注射		●		
		カルボプラチン （AUC=6）	0m g/A			
		5%ブドウ糖注 250m l	250m L			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	8	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg／1m l	6.6m g			
		生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100m L			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	10	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回 アロキシ投与前後フラッシュ用				
注射	11	点滴注射			●	●
		アブラキサン注 （100mg/m ² ）	100m g/m ²			
		生理食塩液 P L 50m l （1バールあたり20mLで溶解）	50m L			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で				