

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●	●
注射	2	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（テントリカ）	1瓶	●		
注射	3	点滴注射 テセントリク注 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （1200mg/body） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与。 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。	1200mg 250mL	●		
注射	4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロカリス注 235mg/10mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で テントリカと別（フィルターなし）ルートで。	6.6mg 1瓶 1袋	●		
注射	5	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブキカ投与前後フラッシュ用	1瓶	●		
注射	6	点滴注射 アブラキサン注 （100mg/mL） 生理食塩液 PL 50mL （1バールあたり20mLで溶解） 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/mL 50mL	●		
注射	7	点滴注射 カルボプラチン （AUC=6） 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 60分で	0mg/A 250mL	●		
注射	8	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で	1瓶	●		
注射	9	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL		●	●
注射	10	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブキカ投与前後フラッシュ用	1瓶		●	●
注射	11	点滴注射 アブラキサン注 （100mg/mL） 生理食塩液 PL 50mL （1バールあたり20mLで溶解） 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/mL 50mL		●	●