

レジメン名称：C15-203 CBDCA(5)/ETP(80) (d1-3) triweekly

休薬期間：21日

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1 静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2 点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3 点滴注射		●		
	カルボプラチン (AUC=5)	0mg/A			
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射	4 点滴注射		●		
	エトポシド注 (80mg/m ²)	80mg/m ²			
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
	点滴注射：1日1回 90分で				
注射	5 点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射	6 点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	7 点滴注射			●	●
	エトポシド注 (80mg/m ²)	80mg/m ²			
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
	点滴注射：1日1回 90分で				
注射	8 点滴注射			●	●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				