

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		ポララミン注 5mg / 1ml	1A			
		ガスター注 20mg	1A			
		デキサート注 3.3mg / 1ml	16.5mg			
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	3	点滴注射		●		
		アバスチン注	15mg / kg			
		(15mg/kg)				
		生食注 (生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	4	点滴注射		●		
		ハイカムチン注	0.75mg / m ²			
		(0.75mg/m ²)				
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	5	点滴注射		●		
		パクリタキセル注	175mg / m ²			
		(175mg/m ²)				
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用				
		180分で				
注射	6	点滴注射		●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
注射	7	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg			
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		ハイカムチン注	0.75mg / m ²			
		(0.75mg/m ²)				
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				