

レジメン名称：A15-303 Bev/Abraxane (d1,8,15)/CBDCA triweekly 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3	点滴注射		●		
		アバスチン注 （15mg/kg）	15mg/kg			
		生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）	50mL			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	4	点滴注射		●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前後フラッシュ用				
注射	5	点滴注射		●		
		アブラキサン注 （100mg/mL）	100mg/mL			
		生理食塩液PL 50mL （1バialあたり20mLで溶解）	50mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で				
注射	6	点滴注射		●		
		カルボプラチン （AUC=6）	0mg/A			
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	7	点滴注射		●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前後フラッシュ用				
注射	10	点滴注射			●	●
		アブラキサン注 （100mg/mL）	100mg/mL			
		生理食塩液PL 50mL （1バialあたり20mLで溶解）	50mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で				