

レジメン名称：F22-301 DCF(70-70-3750) triweekly（腫内） 休業期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ペリナNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ペミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
		フラッシュ用		
注射	2	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		メイン①		
		2時間で		
注射	3	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		メイン②		
		90分で		
注射	4	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		メイン③		
		60分で		
注射	5	点滴側管注		●
		プロイメンド注 150mg	150mg	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム3Aと同時に（側注①）		
		30分で		
注射	6	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		（側注②）		
		15分で		
注射	7	点滴側管注		●
		ドセタキセル注	70mg/m ²	
		（70mg/m ² ）		
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		（側注③）		
		60分で		
注射	8	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回		
		（側注④）		
		30分で		
注射	9	点滴側管注		●
		シスプラチン注	70mg/m ²	
		（70mg/m ² ）		
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		（側注⑤）		
		ソルデム1本終了後		
		60分で		
注射	10	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		
注射	11	点滴側管注		●
		5-FU注	3750mg/m ²	
		（3750mg/m ² ）		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	2瓶	
		（全量235mLに調製）		
		点滴注射：1日1回		
		LV2（黄色タイプ）使用。		
		120時間で		
注射	12	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
		フラッシュ用		