

レジメン名称：D23-301 Durva(d1)/GC(d1,8) triweekly (BW>30kg) 休薬期間：21日

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック）	1筒		
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2 点滴注射		●	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶		
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（イミフィンジ）			
注射	3 点滴注射		●	
	イミフィンジ注 （1500mg/body）	1500mg		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 60分以上かけて			
注射	4 点滴注射		●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	5 点滴注射		●	●
	ジェムザール注 （1000mg/m ² ）	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	6 点滴注射		●	●
	シスプラチン注 （25mg/m ² ）	25mg/m ²		
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射	7 点滴注射		●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			