

レジメン名称：P21-201 FP（1000/75）（5-FU:96時間,インフューザ-）monthly 休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNa吸引用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴側管注		●
		プロイメンド注 150mg	150mg	
		生食注（生理食塩液）100m l （PG）	100m L	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム3Aと同時に側管から		
		30分で		
注射	3	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg	
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		15 分で		
注射	4	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300m L / 袋	300m L	
		点滴注射：1日1回		
		30 分で		
注射	5	点滴側管注		●
		シスプラチン注	75mg / m ²	
		（75mg/m ² ）		
		生理食塩液注 250m l （ソフトバッグ）	250m L	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム1本終了後		
		60 分で		
注射	6	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		（フラッシュ用）		
注射	7	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500m l	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		キイトルーダ終了後に開始		
		90分で		
注射	8	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500m L	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		
注射	9	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500m L	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		60 分で		
注射	10	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		フラッシュ用		
		（不要の場合は削除）		
注射	11	点滴注射(リザーバーより)		●
		5-FU注	4000mg / m ²	
		（4000mg/m ² ）		
		生食注（生理食塩液）100m l （PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		LV2で全量185mLに調製。		
		96時間で		