

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	静脈内注射		●	●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒				
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)					
注射	2	点滴注射		●	●	●	●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg				
		ボララミン注 5mg / 1m l	1A				
		ガスター注 20mg	1A				
		生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100mL				
		点滴注射：1日1回 30分で					
注射	3	点滴注射		●		●	●
		生理食塩液 P L 50m l	50m L				
		30分で(PTX投与前の時間確保用)					
		点滴注射：1日1回					
注射	4	点滴注射		●			
		パクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg / m ²				
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L				
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で					
注射	5	点滴注射		●			
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶				
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で					
注射	6	点滴注射			●		
		アバスチン注 (15mg/kg)	15mg / kg				
		生食注 (生理食塩液) 50m L (ソフトバッグ)	50m L				
		点滴注射：1日1回 30分で					
注射	7	点滴注射			●	●	●
		パクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg / m ²				
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L				
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で					
注射	8	点滴注射			●	●	●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶				
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で					