

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1 静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNa付用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ヘパリン)	1筒			
	ワンショット：1日1回				
	(不要の場合は削除)				
注射	2 点滴注射		●		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶			
	点滴注射：1日1回				
	インラインフィルター使用				
	ライン確保及びフラッシュ用(キイトルーダ)				
注射	3 点滴注射		●		
	キイトルーダ注	200mg			
	(200mg/body)				
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
	点滴注射：1日1回				
	インラインフィルター使用、単独投与				
	30分で				
注射	4 点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg/mL	6.6mg			
	ボララミン注 5mg/mL	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回				
	30分で				
注射	5 点滴注射		●		
	パクリタキセル注	80mg/m ²			
	(80mg/m ²)				
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回				
	インラインフィルターを使用				
	60分で				
注射	6 点滴注射		●		
	カルボプラチン	0mg/A			
	(AUC=5)				
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
	点滴注射：1日1回				
	60分で				
注射	7 点滴注射		●		
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回				
	フラッシュ用				
	10分で				
注射	8 点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg/mL	6.6mg			
	ボララミン注 5mg/mL	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
	点滴注射：1日1回				
	30分で				
注射	9 点滴注射			●	●
	パクリタキセル注	80mg/m ²			
	(80mg/m ²)				
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回				
	インラインフィルターを使用				
	60分で				
注射	10 点滴注射			●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回				
	フラッシュ用				
	10分で				