

レジメン名称：F15-205 FP(70-700)(5-FU:96時間,インフューザ-)(頭頸部) 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNa付用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパリック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） リザーバーフラッシュ用	1筒 1筒	●
注射	2	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 90分で	500mL	●
注射	3	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射	4	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射	5	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 ルート確保用	1瓶	●
注射	6	点滴側管注 デキサート注 3.3mg/1mL アロカリス注 235mg/10mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	9.9mg 1瓶 1袋	●
注射	7	点滴側管注 マンニトールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 30分で	300mL	●
注射	8	点滴側管注 シスプラチン注 （70mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	70mg/m ² 250mL	●
注射	9	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射	10	持続点滴 5-FU注 （3500mg/m ² /96時間） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） （全量185mLに調製） 持続点滴：1日1回 インフューザ-LV2（黄色タイプ）使用 96時間で	3500mg/m ² 1瓶	●