

レジメン名称：P16-102 PTX weekly（婦人科癌）

休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●	●	●
		デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	6.6m g			
		ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A			
		ガスター注 20 m g	1 A			
		生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	100m L			
		点滴注射：1日1回 30 分で				
注射	3	点滴注射		●	●	●
		生理食塩液 P L 50 m l	50m L			
		30分で(PTX投与前の時間確保用)				
		点滴注射：1日1回				
注射	4	点滴注射		●	●	●
		パクリタキセル注 (80mg/m ²)	80m g / m ²			
		生理食塩液注 250 m l (ソフトバッグ)	250m L			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60 分で				
注射	5	点滴注射		●	●	●
		生理食塩液 P L 50 m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で				