

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 (キイトルーダ)		
注射	3 点滴注射		●
	キイトルーダ注 (200mg/body)	200mg	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	ポララミン注 5mg / 1mL	1A	
	ガスター注 20mg	1A	
	デキサート注 3.3mg / 1mL	16.5mg	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5 点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50mL	50mL	
	30分で(PTX投与前の時間確保用) 点滴注射：1日1回		
注射	6 点滴注射		●
	パクリタキセル注 (175mg/m ²)	175mg / m ²	
	生理食塩液注 【生食】 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射	7 点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=5)	0mg / A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射	8 点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		