

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ヘパリンロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		(不要の場合は削除)		
注射	2	点滴側管注		●
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		ライン確保・オブジーボフラッシュ用		
注射	3	点滴注射		●
		オブジーボ注	360mg	
		(360mg/Body)		
		生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルター使用		
		単独投与、ソルデムと併用しない		
		30分で		
注射	4	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		オブジーボ終了後投与開始		
		90分で		
注射	5	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		90分で		
注射	6	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		
注射	7	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	8	点滴側管注		●
		ペトレクト注	500mg/m ²	
		(500mg/m ²)		
		生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL	
		点滴注射：1日1回		
		オブジーボ投与後30分あけて		
		10分で		
注射	9	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	10	点滴側管注		●
		シスプラチン注	75mg/m ²	
		(75mg/m ²)		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム1本終了後		
		60分で		
注射	11	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		