

レジメン名称：D20-303 Durva(BW≦30)/CDDP/ETP（d1-3） q3w 休業期間：21日

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 200mL【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパロック）	1筒			
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射 2	点滴注射		●		
	生食注（生理食塩液）1000mL（PG）	1瓶			
	点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用（イミフィンジ）				
注射 3	点滴側管注		●		
	イミフィンジ注 （BW≦30の場合は20mg/kg）	20mg/kg			
	生食注（生理食塩液）1000mL（PG）	100mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 60分以上かけて				
注射 4	点滴側管注		●		
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg			
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 5	点滴側管注		●		
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 6	点滴側管注		●		
	シスプラチン注 （75～80mg/m ² ）	80mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で				
注射 7	点滴側管注		●		
	エトポシド注 （80～100mg/m ² ）	100mg/m ²			
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
	点滴注射：1日1回 90分で				
注射 8	点滴側管注		●		
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射 9	点滴注射		●		
	ソルデム3A注 500mL	500mL			
	点滴注射：1日1回 イミフィンジ終了後に開始 90分で				
注射 10	点滴注射		●		
	ヴィーン3G注 500mL	500mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 11	点滴注射		●		
	ヴィーン3G注 500mL	500mL			
	点滴注射：1日1回 60分かけて				
注射 12	点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	生食注（生理食塩液）1000mL（PG）	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 13	点滴注射			●	●
	エトポシド注 （80～100mg/m ² ）	100mg/m ²			
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
	点滴注射：1日1回 90分で				
注射 14	点滴注射			●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用				