

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2 点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3 点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 アロカリスフラッシュ用			
注射	4 点滴注射		●	
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	5 点滴注射		●	
	カルボプラチン (AUC=4-6)	0mg/A		
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL		
	点滴注射：1日1回 60分で			
注射	6 点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	7 点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	8 点滴注射			●
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	9 点滴注射			●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			