

レジメン名称：V15-202放射線併用VNR(d1,8)/CDDP(d1,8)triweekly

休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	●
		ナベルビン注 (20mg/m ²)	20mg/m ²		
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 全開で			
注射	4	点滴注射		●	●
		シスプラチン注 (40mg/m ²)	40mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	5	点滴注射		●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		フラッシュ用 点滴注射：1日1回			