

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                    | 投与量                   | day(1) |
|----|-----|------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 注射 | 1   | 静脈内注射（リザーバーより）                           |                       | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付                   | 1筒                    |        |
|    |     | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパミロック） | 1筒                    |        |
|    |     | ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）                |                       |        |
| 注射 | 2   | 点滴側管注                                    |                       | ●      |
|    |     | デキサート注 3. 3mg / 1m l                     | 9.9mg                 |        |
|    |     | アロカリス注 235mg / 10m L                     | 1瓶                    |        |
|    |     | アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L                  | 1袋                    |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>ソルデム3Aと同時に側管投与<br>30分で      |                       |        |
| 注射 | 3   | 点滴側管注                                    |                       | ●      |
|    |     | 生理食塩液P L 50m l                           | 50m L                 |        |
|    |     | アロカリス後フラッシュ用<br>点滴注射：1日1回                |                       |        |
| 注射 | 4   | 点滴側管注                                    |                       | ●      |
|    |     | 硫酸Mg補正液 20ml(=コンクラMg)                    | 1A                    |        |
|    |     | 生食注（生理食塩液）100m l（P G）                    | 100m L                |        |
|    |     | 30分で<br>点滴注射：1日1回                        |                       |        |
| 注射 | 5   | 点滴側管注                                    |                       | ●      |
|    |     | シスプラチン注<br>（40mg/m <sup>2</sup> ）        | 40mg / m <sup>2</sup> |        |
|    |     | 生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）                    | 250m L                |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>ソルデム1本終了後<br>60分で           |                       |        |
| 注射 | 6   | 点滴注射                                     |                       | ●      |
|    |     | ソルデム3A注 500m l                           | 500m L                |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>メイン<br>60分で                 |                       |        |
| 注射 | 7   | 点滴注射                                     |                       | ●      |
|    |     | ヴィーン3G注 500m L                           | 500m L                |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>メイン<br>2時間で                 |                       |        |
| 注射 | 8   | 点滴側管注                                    |                       | ●      |
|    |     | 生理食塩液P L 50m l                           | 1瓶                    |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用。                     |                       |        |