

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                                     | 投与量                    | day(1) |
|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 注射 | 1   | 静脈内注射                                                     |                        | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付                                     | 1筒                     |        |
|    |     | ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)                    | 1筒                     |        |
|    |     | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)                                 |                        |        |
| 注射 | 2   | 点滴注射                                                      |                        | ●      |
|    |     | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）                                       | 1瓶                     |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>ライン確保およびフラッシュ用（セントリク）                        |                        |        |
| 注射 | 3   | 点滴注射                                                      |                        | ●      |
|    |     | テセントリク注                                                   | 1200mg                 |        |
|    |     | 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）<br>(1200mg/body)                     | 250mL                  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用。<br>初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。 |                        |        |
| 注射 | 4   | 点滴側管注                                                     |                        | ●      |
|    |     | デキサート注 3.3mg / 1mL                                        | 9.9mg                  |        |
|    |     | アロカリス注 235mg / 10mL                                       | 1瓶                     |        |
|    |     | アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL                                    | 1袋                     |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>30分で                                         |                        |        |
| 注射 | 5   | 点滴側管注                                                     |                        | ●      |
|    |     | ベトレキド注                                                    | 500mg / m <sup>2</sup> |        |
|    |     | (500mg/m <sup>2</sup> )                                   |                        |        |
|    |     | 生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）                                    | 50mL                   |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>10分で                                         |                        |        |
| 注射 | 6   | 点滴側管注                                                     |                        | ●      |
|    |     | マンニトールS注 300mL / 袋                                        | 300mL                  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>30分で                                         |                        |        |
| 注射 | 7   | 点滴側管注                                                     |                        | ●      |
|    |     | シスプラチン注                                                   | 75mg / m <sup>2</sup>  |        |
|    |     | (75mg/m <sup>2</sup> )                                    |                        |        |
|    |     | 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）                                      | 250mL                  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>ソルデム1本終了後<br>60分で                            |                        |        |
| 注射 | 8   | 点滴注射                                                      |                        | ●      |
|    |     | 生理食塩液PL 50mL                                              | 1瓶                     |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                                       |                        |        |
| 注射 | 9   | 点滴注射                                                      |                        | ●      |
|    |     | ソルデム3A注 500mL                                             | 500mL                  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>テセントリク終了後に開始<br>90分で                         |                        |        |
| 注射 | 10  | 点滴注射                                                      |                        | ●      |
|    |     | ヴィーン3G注 500mL                                             | 500mL                  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>90分で                                         |                        |        |
| 注射 | 11  | 点滴注射                                                      |                        | ●      |
|    |     | ヴィーン3G注 500mL                                             | 500mL                  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>60分で                                         |                        |        |