

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	2	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●
		生食注シリンジ 20mLロック付	1筒				
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック） （不要の場合は削除）	1筒				
		ワンショット：1日1回					
注射	3	点滴注射		●	●	●	●
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL				
		点滴注射：1日1回					
		ルート確保およびフラッシュ用					
注射	4	点滴注射		●	●	●	●
		エンドキサン注 （300mg/m ² 、最大500mg/B）	300mg/m ²				
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL				
		点滴注射：1日1回					
		15分で					
注射	5	皮下注射		●	●	●	●
		ダラキューロ配合皮下注 （1800mg/body）	1800mg				
		ワンショット：1日1回					
		エンドキサン点滴後					
		時計回りに腹部皮下組織に投与 3～5分で					
注射	6	皮下注射		●	●	●	●
		ベルケイド注 （1.3mg/m ² ）	1.3mg/m ²				
		生理食塩液注 20mL （1Vあたり生食1.2mLで溶解）	1.2mL				
		ワンショット：1日1回					
		ダラキューロ投与後					
内服		デキサメタゾン	20mg/日	day(1)(2)(8)(9)(15)(16)(22)(23)服用 分1 食後、又は、ダラキューロ投与日は投与前			