

レジメン名称：N20-203 Nivo/lpi triweekly(MSI-High結腸・直腸癌) 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパリンロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 ルート確保用		
注射	3	点滴注射		●
		オプジーボ注 （240mg/Body）	240mg	
		生食注（生理食塩液） 50mL（ソフトバッグ）	50mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分以上かけて		
注射	4	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液） 100mL（PG）	1瓶	
		投与間隔30分確保用 点滴注射：1日1回 30分で		

注射	5 点滴注射		●
	ヤーボイ注	1m g /kg	
	(1mg/kg)		
	生理食塩液 P L 5 0 m l	50m L	
	(全量30mLに調製)		
	点滴注射：1 日 1 回		
	インラインフィルターを使用		
	30分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶	
	点滴注射：1 日 1 回		
	フラッシュ用		
注射	7 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ワンショット：1 日 1 回		
	フラッシュ用		
	(不要の場合は削除)		