

レジメン名称：B22-101 Blinatumomab在宅ポンプ用 5  $\mu$ g/ $m^2$  72hr Dex有 休薬期間：3日

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                                                                                                                                                                                                                                       | 投与量                                                | day(1) |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 注射 | 2   | 静脈内注射                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20m l ロック付<br>(不要の場合は削除)<br>ワンショット：1日1回                                                                                                                                                                                                             | 1筒                                                 |        |
| 注射 | 3   | 点滴注射                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | ●      |
|    |     | デキサート注 3.3mg / 1m l 【ケト】<br>生理食塩液 P L 50m l<br>15分で<br>ビーリンサイトと別ルートで<br>点滴注射：1日1回                                                                                                                                                                           | 16.5mg<br>50m L                                    |        |
| 注射 | 4   | 持続点滴                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | ●      |
|    |     | 【要時】ビーリンサイト注<br>15 $\mu$ g/ $m^2$ /72h (最大27 $\mu$ g/72h)<br>注射用水 20m L<br>ビーリンサイト 1V / DW 3mLで溶解<br>生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)<br>生理食塩液注 20m l<br>生食270mL使用、輸液安定化液5.5mL/袋を加える<br>調製後は専用の輸液バッグに250mLを充填<br>持続点滴：1日1回<br>インラインフィルター使用<br>3.3mL/h (専用ポンプ使用) ★残破棄★ | 15 $\mu$ g/ $m^2$<br><br>1A<br><br>250m L<br>20m L |        |