

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回 ライン確保用		
注射	3	点滴注射		●
		【要時】イジユド注 （75mg/body）	75mg	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 60分で		
注射	4	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 5分で（経過観察用）		
注射	5	点滴注射		●
		イミフィンジ注 （1500mg/body）	1500mg	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 60分で		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 5分で（経過観察用）		
注射	7	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg	
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	8	点滴注射		●
		ペムセド注 （500mg/m ² ）	500mg/m ²	
		生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）	50mL	
		点滴注射：1日1回 10分で ペムセド投与後、30分の経過観察不要		
注射	9	点滴注射		●
		カルボプラチン （AUC=5-6）	0mg/A	
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
		点滴注射：1日1回 60分で ペムセド投与後、30分の経過観察不要		
注射	10	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		