

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20m l【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNa点滴用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液） 100m l（PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		ライン確保及びフラッシュ用(キトルダ)		
注射	3	点滴注射		●
		キトルダ注 (200mg/body)	200m g	
		生食注（生理食塩液） 100m l（PG）	100m L	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用、単独投与		
		30分で		
注射	4	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3m g／1m l	9.9m g	
		アロカリス注 235m g/10m L	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75m g／50m L	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム3Aと同時に側管から		
		30分で		
注射	5	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300m L/袋	300m L	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	6	点滴側管注		●
		シスプラチン注 (100mg/m²)	100m g /m ²	
		生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム1本終了後		
		60分で		
注射	7	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		（フラッシュ用）		
注射	8	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500m l	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		キトルダ終了後に開始		
		90分で		
注射	9	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500m L	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		
注射	10	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500m L	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		
注射	11	点滴注射(リザーバーより)		●
		５－ＦＵ注 (4000mg/m²)	4000m g /m ²	
		生食注（生理食塩液） 100m l（PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		LV2で全量185mLに調製。		
		96時間で		