

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                   | 投与量                 | day(1) | day(15)       | day(29) |
|----|-----|-----------------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------|
| 注射 | 1   | 静脈内注射                                   |                     | ●      | ●             | ●       |
|    |     | 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付                    | 1筒                  |        |               |         |
|    |     | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ペミロック) | 1筒                  |        |               |         |
|    |     | ワンショット：1日1回                             |                     |        |               |         |
|    |     | (不要の場合は削除)                              |                     |        |               |         |
| 注射 | 2   | 点滴注射                                    |                     | ●      | ●             | ●       |
|    |     | 生食注(生理食塩液) 100mL (PG)                   | 100mL               |        |               |         |
|    |     | 点滴注射：1日1回                               |                     |        |               |         |
|    |     | ルート確保およびフラッシュ用                          |                     |        |               |         |
| 注射 | 3   | 点滴注射                                    |                     | ●      | ●             | ●       |
|    |     | アバスチン注                                  | 5mg/kg              |        |               |         |
|    |     | (5mg/kg)                                |                     |        |               |         |
|    |     | 生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)                | 50mL                |        |               |         |
|    |     | 点滴注射：1日1回                               |                     |        |               |         |
|    |     | 30分で                                    |                     |        |               |         |
| 内服 |     |                                         |                     |        |               |         |
|    |     | S-1                                     | 80mg/m <sup>2</sup> |        | day(1)~(28)服用 |         |
|    |     |                                         | 分2 食後               |        |               |         |