

| 分類 No. | 薬剤/手技                                       | 投与量                      | day(1) |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 注射     | 1 静脈内注射                                     |                          | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付                    | 1筒                       |        |
|        | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリンロック) | 1筒                       |        |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)                   |                          |        |
| 注射     | 2 点滴注射                                      |                          | ●      |
|        | パララミン注 5 m g / 1 m l                        | 1 A                      |        |
|        | ガスター注 20 m g                                | 1 A                      |        |
|        | デキサート注 3. 3 m g / 1 m l                     | 16.5 m g                 |        |
|        | アロカリス注 235 m g / 10 m L                     | 1瓶                       |        |
|        | アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 m L                  | 1袋                       |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30分で                           |                          |        |
| 注射     | 3 点滴注射                                      |                          | ●      |
|        | アバスチン注<br>(15mg/kg)                         | 15 m g / kg              |        |
|        | 生食注 (生理食塩液) 50 m L (ソフトバッグ)                 | 50 m L                   |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30 分で                          |                          |        |
| 注射     | 4 点滴注射                                      |                          | ●      |
|        | バクリタキセル注<br>(200mg/m <sup>2</sup> )         | 200 m g / m <sup>2</sup> |        |
|        | 生理食塩液注 【生食】 500 m l                         | 500 m L                  |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>インラインフィルターを使用<br>180分で         |                          |        |
| 注射     | 5 点滴注射                                      |                          | ●      |
|        | カルボプラチン<br>(AUC=4-6)                        | 0 m g / A                |        |
|        | 5 %ブドウ糖注 250 m l                            | 250 m L                  |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>60 分で                          |                          |        |
| 注射     | 6 点滴注射                                      |                          | ●      |
|        | 生理食塩液 P L 50 m l                            | 1瓶                       |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                         |                          |        |