

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                    | 投与量                    | day(1) |
|----|-----|------------------------------------------|------------------------|--------|
| 注射 | 1   | 静脈内注射                                    |                        | ●      |
|    |     | 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付                   | 1筒                     |        |
|    |     | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘミロック) | 1筒                     |        |
|    |     | ワンショット：1日1回                              |                        |        |
|    |     | (不要の場合は削除)                               |                        |        |
| 注射 | 2   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | 生食注(生理食塩液) 100m l (P G)                  | 1瓶                     |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | ライン確保およびフラッシュ用(キイトルダ)                    |                        |        |
| 注射 | 3   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | キイトルダ注                                   | 200mg                  |        |
|    |     | (200mg/body)                             |                        |        |
|    |     | 生食注(生理食塩液) 100m l (P G)                  | 100m L                 |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | インラインフィルター使用、単独投与                        |                        |        |
|    |     | 30分で                                     |                        |        |
| 注射 | 4   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | デキサート注 3.3mg / 1m l                      | 16.5mg                 |        |
|    |     | ガスター注 20mg                               | 1A                     |        |
|    |     | ポラミン注 5mg / 1m l                         | 1A                     |        |
|    |     | アロカリス注 235mg / 10m L                     | 1瓶                     |        |
|    |     | アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L                  | 1袋                     |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | 30分で                                     |                        |        |
| 注射 | 5   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | アバスチン注                                   | 15mg / kg              |        |
|    |     | (15mg/kg)                                |                        |        |
|    |     | 生食注(生理食塩液) 50m L (ソフトバッグ)                | 50m L                  |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | 30分で                                     |                        |        |
| 注射 | 6   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | バクリタキセル注                                 | 175mg / m <sup>2</sup> |        |
|    |     | (175mg/m <sup>2</sup> )                  |                        |        |
|    |     | 生理食塩液注【生食】 500m l                        | 500m L                 |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | インラインフィルターを使用                            |                        |        |
|    |     | 180分で                                    |                        |        |
| 注射 | 7   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | マンニトールS注 300m L / 袋                      | 300m L                 |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | 30分で                                     |                        |        |
| 注射 | 8   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | シスプラチン注                                  | 50mg / m <sup>2</sup>  |        |
|    |     | (50mg/m <sup>2</sup> )                   |                        |        |
|    |     | 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)                   | 250m L                 |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | ソルデム1本終了後                                |                        |        |
|    |     | 60分で                                     |                        |        |
| 注射 | 9   | 点滴側管注                                    |                        | ●      |
|    |     | 生理食塩液P L 50m l                           | 1瓶                     |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | (フラッシュ用)                                 |                        |        |
| 注射 | 10  | 点滴注射                                     |                        | ●      |
|    |     | ソルデム3A注 500m l                           | 500m L                 |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | 2時間で                                     |                        |        |
| 注射 | 11  | 点滴注射                                     |                        | ●      |
|    |     | ヴィーン3G注 500m L                           | 500m L                 |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | 2時間で                                     |                        |        |
| 注射 | 12  | 点滴注射                                     |                        | ●      |
|    |     | ヴィーン3G注 500m L                           | 500m L                 |        |
|    |     | 点滴注射：1日1回                                |                        |        |
|    |     | 90分で                                     |                        |        |