

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                     | 投与量                          | day(1)        |
|----|-----|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 注射 | 1   | 静脈内注射                                     |                              | ●             |
|    |     | 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付                     | 1筒                           |               |
|    |     | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック) | 1筒                           |               |
|    |     | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)                 |                              |               |
| 注射 | 2   | 点滴注射                                      |                              | ●             |
|    |     | デキサート注 3.3mg/1mL                          | 6.6mg                        |               |
|    |     | アロカリス注 235mg/10mL                         | 1瓶                           |               |
|    |     | アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL                      | 1袋                           |               |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>30分で                         |                              |               |
| 注射 | 3   | 点滴注射                                      |                              | ●             |
|    |     | カルボプラチン<br>(AUC=5)                        | 0mg/A                        |               |
|    |     | 5%ブドウ糖注 250mL                             | 250mL                        |               |
|    |     | 点滴注射：1日1回<br>60分で                         |                              |               |
| 注射 | 4   | 点滴注射                                      |                              | ●             |
|    |     | 生理食塩液PL 50mL<br>フラッシュ用                    | 1瓶                           |               |
|    |     | 10分で<br>点滴注射：1日1回                         |                              |               |
| 内服 |     |                                           |                              |               |
|    | S-1 |                                           | 80mg/m <sup>2</sup><br>分2 食後 | day(1)～(14)服用 |