

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(4)	day(8)	day(11)	day(15)	day(22)	day(25)
注射	2	皮下注射		●		●		●	●	
		ダラキューロ配合皮下注 (1800mg/body) ワンショット：1日1回 時計回りに腹部皮下組織に投与 3～5分で	1800m g							
注射	3	皮下注射		●		●			●	
		ベルケイド注 (1.3mg/m ²) 生理食塩液注 20m l (1Vあたり生食1.2mLで溶解) ダラキューロ投与後 ワンショット：1日1回	1.3m g /m ² 1.2m L							
注射	4	皮下注射			●		●			●
		ベルケイド注 (1.3mg/m ²) 生理食塩液注 20m l (1Vあたり生食1.2mLで溶解) ワンショット：1日1回	1.3m g /m ² 1.2m L							
分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(29)	day(32)	day(36)				
注射	5	皮下注射		●		●				
		ダラキューロ配合皮下注 (1800mg/body) ワンショット：1日1回 時計回りに腹部皮下組織に投与 3～5分で	1800m g							
注射	6	皮下注射		●						
		ベルケイド注 (1.3mg/m ²) 生理食塩液注 20m l (1Vあたり生食1.2mLで溶解) ダラキューロ投与後 ワンショット：1日1回	1.3m g /m ² 1.2m L							
注射	7	皮下注射			●					
		ベルケイド注 (1.3mg/m ²) 生理食塩液注 20m l (1Vあたり生食1.2mLで溶解) ワンショット：1日1回	1.3m g /m ² 1.2m L							
内服										
		メルファラン	9mg/m ² 分1 食後		day(1)～(4)服用					
内服										
		プレドニゾロン	60mg/m ² 分1 食後		day(2)～(4)服用					
内服										
		レナデックス	20mg/日 分1 ダラキューロ投与前		day(1)(8)(15)(22)(29)(36)服用					