

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパミロック）	1筒	
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管投与 30分で		
注射	3 点滴側管注		●
	シスプラチン注	40mg/m ²	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （30–40mg/m ² ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 下記投与量より低用量で開始する場合あり ソルデム1本終了後 60分で		
注射	4 点滴側管注		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	5 点滴注射		●
	ソルデム3A注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 メイン 60分で		
注射	6 点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 メイン 2時間で		