

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	
		ナベルビン注 (20-25mg/m ²)	25mg/m ²		
		生理食塩液 PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 全開で			
注射	4	点滴注射		●	
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL		
		カルボプラチン (AUC=4-6)	0mg/A		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	5	点滴注射		●	
		生理食塩液 PL 50mL	50mL		
		フラッシュ用 点滴注射：1日1回			
注射	6	点滴注射			●
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		ルート確保用、フラッシュ用 点滴注射：1日1回			
注射	7	点滴注射			●
		ナベルビン注 (20-25mg/m ²)	25mg/m ²		
		生理食塩液 PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 全開で			