

| 分類 | No. 薬剤/手技                                                                                                               | 投与量                    | day(1) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 注射 | 1 静脈内注射                                                                                                                 |                        | ●      |
|    | 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付                                                                                                 | 1筒                     |        |
|    | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパミロック)                                                                              | 1筒                     |        |
|    | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)                                                                                               |                        |        |
| 注射 | 2 点滴注射                                                                                                                  |                        | ●      |
|    | ハイドロコートン注 100mg / 2m l                                                                                                  | 100mg                  |        |
|    | ポララミン注 5mg / 1m l                                                                                                       | 1A                     |        |
|    | 生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)                                                                                                 | 100m L                 |        |
|    | 点滴注射：1日1回<br>30 分で                                                                                                      |                        |        |
| 注射 | 3 点滴注射                                                                                                                  |                        | ●      |
|    | リツキシマブBS注<br>(375mg/m <sup>2</sup> )                                                                                    | 375mg / m <sup>2</sup> |        |
|    | 生理食塩液注 【生食】 500m l<br>(1mg/mLになるように調製)                                                                                  | 500m L                 |        |
|    | 生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)<br>(リツキシマブの希釈に使用)                                                                                | 1袋                     |        |
|    | 点滴注射：1日1回<br>初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ<br>400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30<br>分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。<br>3-4h。2回目以降2-3h。 |                        |        |
| 注射 | 4 点滴注射                                                                                                                  |                        | ●      |
|    | 生理食塩液 P L 50m l                                                                                                         | 50m L                  |        |
|    | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                                                                                                     |                        |        |