

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2	点滴注射		●
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
		点滴注射：1日1回 ライン確保およびイジユドフラッシュ用		
注射	3	点滴注射		●
		【要時】 イジユド注 (75mg/Body)	75mg	
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 60 分で		
注射	4	点滴注射		●
		イミフィンジ注 (1500mg/Body)	1500mg	
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 60 分で		
注射	5	点滴注射		●
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	6	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg / 1mL	6.6mg	
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
		点滴注射：1日1回 15 分で		
注射	7	点滴注射		●
		ペメトレキド注 (500mg / m ²)	500mg / m ²	
		生食注 (生理食塩液) 50mL (ソフトバック)	50mL	
		点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	8	点滴注射		●
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		