

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパミロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2	点滴注射		●
		生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	1瓶	
		点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用		
注射	3	点滴注射		●
		テセントリク注	1200m g	
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) (1200mg/body)	250m L	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 初回60分、忍容性良ければ2回目以降30分に短縮可。		
注射	4	点滴注射		●
		デキサート注 3.3m g / 1m l	6.6m g	
		生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	100m L	
		点滴注射：1日1回 15 分で		
注射	5	点滴注射		●
		ペメトレキド注 (500m g /m ²)	500m g /m ²	
		生食注 (生理食塩液) 50m L (ソフトバッグ)	50m L	
		点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		