

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		ライン確保用		
注射	3	点滴注射		●
		オブジーボ注	360mg	
		（360mg/Body）		
		生食注（生理食塩液） 50mL（ソフトバッグ）	50mL	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用		
		30分で		
注射	4	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液） 100mL（PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		投与間隔30分確保・ヤーバイフラッシュ用		
		30分で		
注射	5	点滴注射		●
		ヤーバイ注	1mg/kg	
		（1mg/kg）		
		生理食塩液PL 50mL	30mL	
		（全量30mLに調製）		
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用		
		オブジーボ投与後30分あけて		
		30分で		
注射	6	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	16.5mg	
		ポララミン注 5mg/1mL	1A	
		ガスター注 20mg	1A	
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	7	点滴注射		●
		パクリタキセル注	200mg/m ²	
		（200mg/m²）		
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		ヤーバイ投与後30分あけて		
		インラインフィルターを使用		
		180分で		
注射	8	点滴注射		●
		カルボプラチン	0mg/A	
		（AUC=6）		
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		
注射	9	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		
		10分で		