

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6 m g		
		生食注（生理食塩液） 100 m l （P G）	100m L		
		点滴注射：1日1回 30 分で			
注射	3	点滴注射		●	
		アバスチン注 （15mg/kg）	15m g /kg		
		生食注（生理食塩液） 50 m L （ソフトバッグ）	50m L		
		点滴注射：1日1回 30 分で			
注射	4	点滴注射		●	●
		ジェムザール注 （800-1000mg/m ² ）	1000m g /m ²		
		5 %ブドウ糖注 100 m l	100m L		
		点滴注射：1日1回 30 分で			

注射	5 点滴注射	●
	生理食塩液 P L 5 0 m l	1 瓶
	点滴注射： 1 日 1 回	
	フラッシュ用	
	10 分で	

注射	6 点滴注射	●
	生理食塩液 P L 5 0 m l	1 瓶
	点滴注射： 1 日 1 回	
	10 分で	
	フラッシュ用	



