

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回 ライン確保・オプジーボフラッシュ用		
注射	3	点滴注射		●
		オプジーボ注 （360mg/Body）	360mg	
		生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）	50mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で		
注射	4	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	16.5mg	
		ポララミン注 5mg/1mL	1A	
		ガスター注 20mg	1A	
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5	点滴注射		●
		パクリタキセル注 （200mg/m ² ）	200mg/m ²	
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 オプジーボ投与後30分あけて インラインフィルターを使用 180分で		
注射	6	点滴注射		●
		カルボプラチン （AUC=6）	0mg/A	
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
		点滴注射：1日1回 60分で		
注射	7	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		