

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴側管注		●	
		デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg		
		アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴側管注		●	
		生理食塩液P L 50m l	1瓶		
		点滴注射：1日1回 アロカリスフラッシュ用			
注射	4	点滴注射		●	
		ジェムザール注 (800-1000mg/m2)	1000mg / m ²		
		5%ブドウ糖注 100m l	100m L		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	5	点滴側管注		●	
		マンニトールS注 300m L / 袋	300m L		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	6	点滴側管注		●	
		シスプラチン注 (60-80mg/m ²)	80mg / m ²		
		生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L		
		点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で			
注射	7	点滴側管注		●	
		生理食塩液P L 50m l	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	8	点滴注射		●	
		ソルデム3A注 500m l	500m L		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	9	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500m L	500m L		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	10	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500m L	500m L		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	11	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg		
		生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	100m L		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	12	点滴注射			●
		ジェムザール注 (800-1000mg/m2)	1000mg / m ²		
		5%ブドウ糖注 100m l	100m L		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	13	点滴側管注			●
		生理食塩液P L 50m l	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			