

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパミロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶			
		点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用（イミフィンジ）				
注射	3	点滴注射		●		
		イミフィンジ注 （1500mg/body）	1500mg			
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 60分以上かけて				
注射	4	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	5	点滴注射		●		
		カルボプラチン （AUC=5～6）	0mg/A			
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
		点滴注射：1日1回 60分で				
注射	6	点滴注射		●		
		エトポシド注 （80～100mg/m ² ）	100mg/m ²			
		5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
		点滴注射：1日1回 90分で				
注射	7	点滴注射		●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射	8	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		エトポシド注 （80～100mg/m ² ）	100mg/m ²			
		5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
		点滴注射：1日1回 90分で				
注射	10	点滴注射			●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用				