

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ヘパリンNa溶液100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパリン）	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		（不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●		
		生食注（生理食塩液） 100m l （P G）	100m L			
		点滴注射：1日1回				
		ライン確保用				
注射	3	点滴注射		●		
		【要時】 イジユド注	75m g			
		（75mg/body）				
		生食注（生理食塩液） 100m l （P G）	100m L			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用、単独投与				
		60 分で				
注射	4	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		5分で（経過観察用）				
注射	5	点滴注射		●		
		イミフィンジ注	1500m g			
		（1500mg/body）				
		生食注（生理食塩液） 100m l （P G）	100m L			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルターを使用、単独投与				
		60 分で				
注射	6	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		5分 で（経過観察用）				
注射	7	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6m g			
		アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶			
		アロキン注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
		イジユド・イミフィンジ と別（フィルターなし）ルートで。				
注射	8	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		アロキン投与前後フラッシュ用				
注射	9	点滴注射		●		
		アロキン注	100m g / m l			
		（100mg / m l）				
		生理食塩液 P L 50m l	50m L			
		（1m l あたり20mLで溶解）				
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルター不可				
		30 分で				
注射	10	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0m g / A			
		（AUC=5-6）				
		5%ブドウ糖注 250m l	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		60 分で				
注射	11	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
		10 分で				
注射	12	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6m g			
		生食注（生理食塩液） 100m l （P G）	100m L			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	13	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 50m l	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		アロキン投与前後フラッシュ用				
注射	14	点滴注射			●	●
		アロキン注	100m g / m l			
		（100mg / m l）				
		生理食塩液 P L 50m l	50m L			
		（1m l あたり20mLで溶解）				
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルター不可				
		30 分で				