

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)
注射	1	点滴注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリンロック)	1筒		
		点滴注射：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 15分で			
注射	3	点滴注射		●	
		オンコビン注 (1.4mg/m ² 、最大2mg/B)	1.4mg/m ²		
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 全開で			
注射	4	点滴注射		●	
		エンドキサン注 (750mg/m ²)	750mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	5	点滴注射		●	
		ダカルバジン注 (600mg/m ²)	600mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 1時間で			
注射	6	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	7	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg		
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 15分で			
注射	8	点滴注射			●
		ダカルバジン注 (600mg/m ²)	600mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 1時間で			
注射	9	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			