

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	2	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mLロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック） （不要の場合は削除） ワンショット：1日1回	1筒 1筒	●	●	●	●
注射	3	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用	100mL	●	●	●	●
注射	4	点滴注射 エンドキサン注 （300mg/m ² 、最大500mg/B） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 15分で	300mg/m ² 100mL	●	●	●	●
注射	5	皮下注射 ダラキューロ配合皮下注 （1800mg/body） ワンショット：1日1回 エンドキサン点滴後 時計回りに腹部皮下組織に投与 3～5分で	1800mg	●		●	
注射	6	皮下注射 ベルケイド注 （1.3mg/m ² ） 生理食塩液注 20mL （1Vあたり生食1.2mLで溶解） ワンショット：1日1回 ダラキューロ投与後	1.3mg/m ² 1.2mL	●		●	
注射	7	皮下注射 ベルケイド注 （1.3mg/m ² ） 生理食塩液注 20mL （1Vあたり生食1.2mLで溶解） ワンショット：1日1回 エンドキサン点滴後	1.3mg/m ² 1.2mL		●		●
内服							
		デキサメタゾン	20mg/日 分1 食後、又は、ダラキューロ投与日は投与前	day(1)(2)(15)(16)服用			
内服							
		デキサメタゾン	40mg/日 分1-2 食後	day(8)(22)服用			