

レジメン名称：D23-201 Durva/PEM(Treme/Durva)q4w 維持初回・3回目～ 休薬期間：28日

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびイミフィンジフラッシュ用		
注射	3 点滴注射		●
	イミフィンジ注 (1500mg/Body)	1500m g	
	生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 60 分で		
注射	4 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6m g	
	生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1日1回 15 分で		
注射	5 点滴注射		●
	ペメトレキド注 (500m g / m ²)	500m g / m ²	
	生食注 (生理食塩液) 50 m L (ソフトバッグ)	50m L	
	点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		