

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6 m g	
	アロカリス注 235 m g / 10 m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3 点滴注射		●
	アバスチン注 （15mg/kg）	15 m g / kg	
	生食注（生理食塩液） 50 m L （ソフトバッグ）	50 m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	4 点滴注射		●
	ペメトレキド注 （500mg/m ² ）	500 m g / m ²	
	生食注（生理食塩液） 50 m L （ソフトバッグ）	50 m L	
	点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	5 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液） 100 m l （P G）	100 m L	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	6 点滴注射		●
	カルボプラチン （AUC=4-6）	0 m g / A	
	5 %ブドウ糖注 250 m l	250 m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		