

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
		生食注シリンジ 20 mL 【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパリンロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6 mg			
		アロカリス注 235 mg / 10 mL	1瓶			
		アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋			
		点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50 mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前後フラッシュ用				
注射	4	点滴注射		●		
		アブラキサン注 （100mg/m ² ）	100 mg / m ²			
		生理食塩液 P L 50 mL （1バイアルあたり20mLで溶解）	50 mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30 分で				
注射	5	点滴注射		●		
		カルボプラチン （AUC=6）	0 mg / A			
		5 %ブドウ糖注 250 mL	250 mL			
		点滴注射：1日1回 60 分で				
注射	6	点滴注射		●		
		生理食塩液 P L 50 mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で				
注射	7	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6 mg			
		生食注（生理食塩液）100 mL（P G）	100 mL			
		点滴注射：1日1回 30 分で				
注射	8	点滴注射			●	●
		生理食塩液 P L 50 mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回 アブラキサン投与前後フラッシュ用				
注射	9	点滴注射			●	●
		アブラキサン注 （100mg/m ² ）	100 mg / m ²			
		生理食塩液 P L 50 mL （1バイアルあたり20mLで溶解）	50 mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30 分で				