

レジメン名称：N23-301 Nivo/GEM(d1,8)/CCDP q3w (術前)(扁平上皮癌) 休業期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ペリナドール用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ペリナドール)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴側管注		●	
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 ライン確保用およびフラッシュ用(オプジーボ)			
注射	3	点滴側管注		●	
		オプジーボ注 (360mg/Body)	360mg		
		生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL		
		点滴注射：1日1回 単独投与30分 (インラインフィルター使用)			
注射	4	点滴側管注		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg		
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	5	点滴側管注		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 アロカリスフラッシュ用			
注射	6	点滴側管注		●	
		ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
		5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	7	点滴側管注		●	
		マンニトールS注 300mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	8	点滴側管注		●	
		シスプラチン注 (75mg/m ²)	75mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で			
注射	9	点滴注射		●	
		ソルデム3A注 500mL	1袋		
		オプジーボ投与終了後開始 点滴注射：1日1回 90分で			
注射	10	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	11	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	12	点滴側管注		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	13	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	14	点滴注射			●
		ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
		5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	15	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			