

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100 m l（P G）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保用およびフラッシュ用(オプジーボ）		
注射	3 点滴注射		●
	オプジーボ注 （360mg/Body）	360m g	
	生食注（生理食塩液）50 m L（ソフトバッグ）	50m L	
	点滴注射：1日1回 30分で（インラインフィルター使用）		
注射	4 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	16.5m g	
	ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A	
	ガスター注 20 m g	1 A	
	アロカリス注 235 m g / 10 m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	5 点滴注射		●
	パクリタキセル注 （200mg/m ² ）	200m g / m ²	
	生理食塩液注【生食】 500 m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 180分で		
注射	6 点滴注射		●
	カルボプラチン （AUC=5）	0m g / A	
	5 %ブドウ糖注 250 m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10 分で		