

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(15)
注射	2	静脈内注射		●	●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒				
		ペリリンNa0.4g用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ペリリンNa)	1筒				
		ワンショット：1日1回					
		(不要の場合は削除)					
注射	3	点滴注射		●	●	●	●
		ボララミン注 5mg/mL	1A				
		生理食塩液PL 50mL	50mL				
		点滴注射：1日1回					
		30分で					
注射	4	点滴注射		●			
		ガザイバ注 (100mg/body)	100mg				
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL				
		(全量100mLに調製)					
		インラインフィルター使用					
		点滴注射：1日1回					
		25mL/hで投与。4時間かけて。					
注射	5	点滴注射		●			
		生理食塩液PL 50mL	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		フラッシュ用					
注射	6	持続点滴		●			
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	7	持続点滴		●			
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	8	点滴注射			●		
		ガザイバ注 (900mg/body)	900mg				
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL				
		(全量250mLに調製)					
		インラインフィルター使用					
		点滴注射：1日1回					
		前回IRない場合、14mL/hで開始、					
		30分毎に14mL/hずつ上げ、最大111mL/hまで。					
		前回IRある場合、輸液ポンプを用いて7mL/hで開始、					
		30分毎に14mL/hずつ上げ、最大111mL/hまで。					
注射	9	点滴注射			●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		フラッシュ用					
注射	10	持続点滴			●		
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	11	持続点滴			●		
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
注射	12	点滴注射				●	●
		ガザイバ注 (1000mg/body)	1000mg				
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL				
		(全量250mLに調製)					
		インラインフィルター使用					
		点滴注射：1日1回					
		前回IRない場合、25mL/hで開始、					
		30分毎に25mL/hずつ上げ、最大100mL/hまで。					
		前回IRある場合、12.5mL/hで開始、					
		30分毎に12.5mL/hずつ上げ、最大100mL/hまで。					
注射	13	点滴注射				●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶				
		点滴注射：1日1回					
		フラッシュ用					
注射	14	持続点滴				●	●
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL				
		持続点滴：1日1回					
		8-12時間					
内服							
		アカラブルチニブ	200mg/日		連日服用		
			分2 食後				