

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	2	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	3	持続点滴		●
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
		持続点滴：1日1回 メイン		
注射	4	点滴注射		●
		ポララミン注 5mg / 1mL	1A	
		生理食塩液PL 50mL	50mL	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5	点滴注射		●
		ガザイバ注 （1000mg/body）	1000mg	
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （全量250mLに調製）	250mL	
		インラインフィルター使用 点滴注射：1日1回 前回IRない場合、25mL/hで開始、 30分毎に25mL/hずつ上げ、最大100mL/hまで。 前回IRある場合、12.5mL/hで開始、 30分毎に12.5mL/hずつ上げ、最大100mL/hまで。		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
内服		アカラブルチニブ	200mg/日 分2 食後	連日服用