

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック）	1筒		
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2	皮下注射		●	
		IN フェスゴ配合皮下注	15mL		
		（ヘパルズマブ 1200mg/body, トラスツマブ 600mg/body）			
		ワンショット：1日1回 大腿部に皮下投与 初回は8分以上かけて			
注射	3	点滴注射		●	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶		
		点滴注射：1日1回 30分で（プライミング、フェスゴ皮下注の経過観察用）			
注射	4	点滴注射		●	
		ロゼウス注	25mg/m ²		
		（25mg/m ² ）			
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 全開で			
注射	5	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	6	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 ルート確保用			
注射	7	点滴注射			●
		ロゼウス注	25mg/m ²		
		（25mg/m ² ）			
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 全開で			
注射	8	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			